

									RL:	D 2016
Familie / Gattung / Art	deutscher Name	S/V	BE/FR	BM	FO	G	H	Z/I		
Eristalinae										
<i>Neoascia podagrica</i>	Gemeine Keulenschwebfliege							x	*	
<i>Pipizella viduata</i>	Gemeine Zwergschwebfliege				7a			x	*	
<i>Rhingia campestris</i>	Feld-Schnabelschwebfliege							x	*	
<i>Syrirta pipiens</i>	Gemeine Mistschwebfliege				x			x	*	
<i>Triglyphus primus</i>	Schwarze Dreigliedschwebfliege							x	*	
<i>Volucella bombylans</i>	Pelzige Hummelschwebfliege							x	*	
<i>Volucella zonaria</i>	Große Waldschwebfliege					18a		x		
Arten:		1	35	0	14	1	14	34		

D	RL 0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	RL 1	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	RL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RL 3	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	RL G	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	RL R	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arten gesamt: 56

7a: ALBRECHT, C., ESSER, T., TILLMANN, O., WEGLAU, J. (2007): Vergleichende Untersuchungen der Fauna auf Wiesenflächen im rekultivierten Tagebau Fortuna-Garsdorf - Vergleich der Ergebnisse 1995 und 2007. - Gutachten im Auftrag der RWE-Power AG. [Kartierung 2007]

18a: Klein, H., Scheffler, S. (2018): Beobachtung von *Volucella zonaria* in der Rekultivierung des Tagebaus Garzweiler.

Röder G. (1990): Biologie der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera, Syrphidae). - Erna Bauer, Keltern-Weiler.

Schumann, H., Bährmann, R., Stark, A. (1999): Entomofauna Germanica 2. Checkliste der Dipteren Deutschlands.